

Information om fasteregler og operation

Søren Lauersen Speciallæge i anæstesiologi	Kristian Anthonsen Speciallæge i øre-næse-halssygdomme Vognporten 6 , 2620 Albertslund Tlf. 43643884 og onhalbertslund@gmail.com Akuttelefon, <u>kun</u> ifm. operation: 43647680
---	---

Vi har reserveret tid til behandling af dit barn i fuld bedøvelse _____ dag, den. _____ kl. _____

Mød i god tid, min. 15 min. før og vær klar med sundhedskort, øredråber og aftag overtøj og sko. Barnet skal have været på toilettet lige umiddelbart før operationen. I sygdomstilfælde (mere end normal forkølelse) bedes du kontakte klinikken.

Dit barn **skal** være fastende i 6 timer inden ovennævnte tidspunkt. Dvs. ikke have spist eller drukket 6 timer før operationen. Der må heller ikke indtages mælkeprodukter, tyggegummi eller slik. Det er kun tilladt at drikke ca. 50 ml (1/2 dl) postevand eller rød saftvand op til 2 timer før operationen. Ikke andet.

Når dit barn skal bedøves, er det meget vigtigt, at barnet er fastende i 6 timer før operationen. Årsagen til dette er at skabe størst mulig sikkerhed i forbindelse med bedøvelsen. Hvis barnet ikke er fastende, er der risiko for opkast og dette kan være meget farligt. Bedøvelsen foregår ved indånding af en gas fra en maske, der holdes over næse og mund. Gravide må ikke være til stede ifm. indledning af bedøvelsen. Se evt. børnefilm om bedøvelse inden: <https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/illustrationer/animationer/finn-skal-bedoeses/>

Hvis dit barn har astma eller bronkitis, skal inhalationsmedicin tages om morgenen på operationsdagen og medicinen skal medbringes.

Dit barn bør efter behandling så vidt muligt transporteres til hjemmet i bil, og der bør være en ledsager foruden chaufføren.

Evt. afbud senest 2 dage før. Udeblivelse fra operation uden retmæssigt afbud medfører gebyr på 500 kr.

Om operationerne

Anlæggelse af øredræn:

Der laves et lille hul i trommehinden og der indsættes et lille dræn af gummi. Efter operationen er det normalt med flåd fra ørerne nogle dage. Man skal typisk bruge øredråber på recept, 4 dråber x 2 dagligt i 7 dage efter. Drænet sidder gennemsnitlig i 8 måneder og falder så selv ud, men der er stor forskel fra barn til barn. Barnet kontrolleres efter ca. 14 dage og herefter hvert halve år. Barnet kan komme i institution dagen efter. Barnet bør ikke dykke i svømmehallen og skal undgå sæbevand i ørerne, så længe der er dræn. Ellers er der ingen restriktioner.

Fjernelse af børnepolypper:

Børnepolypper er en klump af lymfevæv, der sidder i næsesvælget, dvs. bag næsehulen, oppe bag drøblen. De skræbes væk ved operation gennem munden. Der er oftest få smerter op til en uge, og det er normalt, at det kan bløde lidt fra næse eller mund. Barnet skal være hjemme med en voksen i 5 dage. Barnet skal have stikpille Panodil efter vægt 1-2 timer inden operationen og ellers Panodil efter behov.

Reduktion af mandler:

Med en brænder fjernes en del af mandlerne. Bagefter er der oftest lette til moderate smerter i op til to uger. Der må kun være ganske let blødning. Barnet bør være hjemme 7 dage. Der kan være lette til moderate synkegener. Barnet må spise det, det har lyst til. Der er ingen madrestriktioner. Der gives stikpille Panodil efter vægt 1-2 timer før operationen og evt. anden medicin på recept for smerter, så længe der er behov.